

dicopeg endo

WYRÓB MEDYCZNY MAKROGOL 3350
Z SYMETYKONEM DO DOUSTNEGO
STOSOWANIA W CELU UZYSKANIA
SKUTECZNEGO OCZYSZCZENIA JELIT
W PRZYGOTOWANIU
DO ENDOSKOPII



Wyrób medyczny  0476

OPAKOWANIE ZAWIERA 4 SASZETKI,
KAŻDA PO 60 g MAKROGOLU
I 80 mg SYMETYKONU



**Bez
recepty!**

Materiał przeznaczony dla środowiska medycznego Kwiecień 2025

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją
używania lub etykietą.

 **Dicofarm**

**Sprawdź, o której godzinie masz badanie,
a dowiesz się, kiedy rozpocząć przyjmowanie**

PIERWSZEJ I DRUGIEJ DAWKI PREPARATU Dicopeg ENDO

GODZINA BADANIA	PIERWSZA DAWKA PREPARATU Dicopeg ENDO (Godzina przyjęcia)	DRUGA DAWKA PREPARATU Dicopeg ENDO (Godzina przyjęcia)
8.00	20.00	2.00
9.00	20.00	3.00
10.00	20.00	4.00
11.00	20.00	5.00
12.00	20.00	6.00
13.00	20.00	7.00
14.00	5.00	8.00
15.00	6.00	9.00
16.00	7.00	10.00
17.00	8.00	11.00
18.00	9.00	12.00
19.00	10.00	13.00
20.00	11.00	14.00

Wsypać zawartość
2 saszetek do 1 l wody,
mocno wstrząsnąć
w butelce i wypić
przygotowany roztwór
w ciągu 1-2 godzin.

Można przyjmować
w mniejszych dawkach,
np. 250 ml roztworu
co 10-15 minut;

Wypić dodatkowe
minimum 1 l samej
wody.



W



Wsypać zawartość
2 saszetek do 1 l wody,
mocno wstrząsnąć
w butelce i wypić
przygotowany roztwór
w ciągu 1-2 godzin.

Można przyjmować
w mniejszych dawkach,
np. 250 ml roztworu
co 10-15 minut;

Wypić dodatkowe
minimum 1 l samej
wody.



W



Godziny podania pierwszej i drugiej dawki należy rozumieć jako przykładowe.
Powinny one być dostosowane do rzeczywistej godziny badania.

Informacje podane w tej ulotce różnią się zastosowaniem większej ilości wody,
od tej podanej w instrukcji używania, dołączonej do opakowania.

Dicofarm S.p.A.
Via del Casale della Marcigliana, 29
00138 Rzym - Włochy

Dystrybutor: **Dicofarm Polska Sp. z o.o.**
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa
www.dicofarm.pl

Dicofarm